


現在の治療薬

1. 非ステロイド性抗炎症薬: 痛み止め
ロキソニン、ボルタレン、セレコックスなど
2. ステロイド薬: プレドニン、リンデロンなど
3. 抗リウマチ薬(広義): 免疫異常を修正・経過を改善
 - (1) 抗リウマチ薬(狭義)(非生物学的製剤)
メトトレキサート(リウマトレックス、メトレートなど)、
リマチル、アザルフィジン、プログラフなど
 - (2) 生物学的製剤
エンブレル、レミケード、ヒュミラ、アクテムラ
4. 胃薬、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の薬など

体が不自由にならない治療とは



抗リウマチ薬

日本リウマチ学会が強く勧めている薬

1. メトトレキサート（リウマトレックス、メトレートなど）
 2. サラゾスルファピリジン（アザルフィジンなど）
 3. ブシラミン（リマチルなど）
 4. プログラフ
- 生物学的製剤
5. レミケード
 6. エンブレル
 7. アクテムラ
 8. ヒュミラ

副作用対策:どの薬でも大事

1. 定期受診、定期検査を欠かさない
2. 体調不良時、早く受診
発熱、ひどい咳、息苦しさ、腹痛など



外来受診して、
採血・レントゲン・検尿など検査を受ける
(3~4日間、家で様子をみない！！)